

APÉNDICE VIII.23

Especies de Psocoptera registradas en Veracruz, localidades de colecta y distribución general

(Para las especies endémicas de México, se incluye la distribución por estado). EM=Endémica de México. EV=Endémica de Veracruz. Distribución tomada principalmente de Lienhard y Smithers (2002).

Psocoptera Trogiomorpha Lepidopsocidae

- Cyrtophania hirsuta* Banks 1931. Los Tuxtlas***. México, Fiji, Hawaii, Polinesia.
Echmepteryx alpha García Aldrete 1984. Los Tuxtlas. Chavarillo, Emiliano Zapata, ca. Jalapa. México tropical, Guatemala, Belice.
Echmepteryx falco (Badonnel 1949). Los Tuxtlas. Tropicopolita.
Echmepteryx intermedia Mockford 1974. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Trinidad.
Echmepteryx madagascariensis (Kolbe 1885). Los Tuxtlas. Tropicopolita.
Neolepopteryx caribensis (Turner 1975). Río Otapa. Jamaica, Antillas Menores, Estados Unidos, México.
Proentomum personatum Badonnel 1949. Río Otapa. Los Tuxtlas. Tropicopolita.
Soa flaviterminata Enderlein 1906. Los Tuxtlas. Tropicopolita.
Thylacella cubana (Banks 1941). 4 km al O de Yanga. Laguna de Alvarado. Chavarillo, Emiliano Zapata, ca. Jalapa. De amplia distribución en América tropical y subtropical.

Psoquillidae

- Psoquilla marginepunctata* Hagen 1865. Los Tuxtlas. De amplia distribución, frecuentemente doméstica.
Rhyopsocus bentonae Sommerman 1956. Los Tuxtlas. México, Estados Unidos.

Trogidae

- Cerobasis guestfalica* (Kolbe 1880). Los Tuxtlas. De amplia distribución, ocasionalmente doméstica.
Cerobasis sp. Los Tuxtlas. EM.
 Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Isla María Madre, N. L., San Luis Potosí, Isla Socorro, Sonora, Veracruz, Yucatán.

Psyllipsocidae

- Psyllipsocus ramburii* Selys-Longchamps 1872. Los Tuxtlas. De amplia distribución, frecuentemente doméstica.
Psyllipsocus sp. 1, ca. *yucatan* Gurney. Puente Nacional, Cueva de la Loma de la Raya Seca. EV.
Psocathropos lachlani Ribaga 1899. Los Tuxtlas. De amplia distribución, a veces doméstica.

Troctomorpha Amphientomidae

- Lithoseopsis* sp. Jilotepec. EV.
Lithoseopsis sp. Los Tuxtlas. El Plan, carretera Jalapa-Zempoala. Ixhuatlán, La Cruz. EM. Chiapas, Veracruz.

Electrentomidae

Epitroctes tuxtларum Mockford 1967. Los Tuxtlas. EM. Oaxaca, Tabasco, Veracruz.

Compsocidae

Compsocus elegans Banks 1930. Los Tuxtlas. México, Panamá.

Musapsocidae

Musapsocus huastecanus Mockford 1967. 16 km al E de Orizaba. EM. Puebla, Tabasco, Veracruz.

Musapsocus tabascensis Mockford 1967. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Tabasco, Veracruz.

Troctopsocidae

Troctopsocus morenus Mockford 1967. Los Tuxtlas. EM. Tabasco, Veracruz.

Liposcelididae

Embidopsocus femoralis (Badonnel 1931). Los Tuxtlas. Angola, Mozambique, México, Estados Unidos.

Embidopsocus luteus Hagen 1866. Los Tuxtlas. Brasil, Cuba, México.

Embidopsocus mexicanus Mockford 1987. Los Tuxtlas. México, Estados Unidos.

Liposcelis bostrychophila Badonnel 1931. Los Tuxtlas. Ca. Jalapa. Cosmopolita.

Liposcelis entomophila (Enderlein 1907). Los Tuxtlas. Cosmopolita.

Liposcelis ca. *mendax* Pearman. Los Tuxtlas. EV.

Pachytroctidae

Nanopsocus oceanicus Pearman 1928. La Nueva Esperanza, Alamo. Los Tuxtlas. Tropicopolita.

Pachytroctes ixtapaensis García Aldrete 1986. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Guerrero, Veracruz.

Tapinella maculata Mockford & Gurney 1956. Los Tuxtlas. La Nueva Esperanza, Alamo. Ca. Tuxpan, margen N del Río Tuxpan, 4 km de la desembocadura al mar. De amplia distribución en América tropical y subtropical.

Tapinella olmeca Mockford 1975. Los Tuxtlas. 2 km al SO de Fortín de las Flores. 4 km al O de Yanga. La Nueva Esperanza, Alamo. México, Guatemala, Belice, Panamá.

Tapinella vittata García Aldrete 1993. Ca. Tuxpan. Ca. Jalapa. Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Chiapas, Hidalgo, Isla María Madre, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz.

Psocomorpha**Cladiopsocidae**

Cladiopsocus garciai Eertmoed 1986. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Dolabellopsocidae

Dolabellopsocus roseus Eertmoed 1973. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz.

Epipsocidae

Epipsocus bullocki García Aldrete 2004. Los Tuxtlas. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. San Rafael Caleria. Actopan-La Mancha. México, Belice, Guatemala, Nicaragua.

Epipsocus petenensis Mockford 1957. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Epipsocus sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Epipsocus sp. 2. Los Tuxtlas. Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, ca. Jalapa, km 2.5 antigua carretera a Coatepec. San Rafael Caleria. Chocamán. EM. Chiapas, Puebla, Veracruz.

Goja moyai Casasola González & García Aldrete 2002. Los Tuxtlas. EV.

Neurostigma dispositum Roesler 1940. Los Tuxtlas. México, Belice, Ecuador, Perú, Brasil.

Ptiloneuridae

Loneura crenata Navás 1927. Los Tuxtlas. Costa Rica, México.

Loneura splendida Mockford 1957. Los Tuxtlas. México, Belice, Guatemala, Nicaragua.

Triplocania spinosa Mockford 1957. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Triplocania vazquezae García Aldrete 1995. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Veracruz.

Asiopsocidae

Notiopsocus sp. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Veracruz.

Amphipsocidae

Polypsocus ca. *corruptus* Hagen, sp. 2. Ca. Altotonga. 7 y 13 km al E de Las Vigas. 23 km al NO de Alvarado. Los Tuxtlas. EM. México, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz.

Polypsocus sp. 6. Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, ca. Jalapa. Los Tuxtlas. EM. Oaxaca, Veracruz.

Caeciliusidae

Stenocaecilius antillanus (Banks 1938). 19 km al S de Alvarado. Estados Unidos, Islas Vírgenes americanas, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Brasil, Surinam, Venezuela, Galápagos.

Stenocaecilius casarum (Badonnel 1931). La Nueva Esperanza, Alamo. 28 km al SE de Paso del Toro. Los Tuxtlas. Cosmopolita.

Valenzuela calochypeus (Mockford & Gurney 1956). 23 km al N de Alvarado. 8 km al S de Tecolutla. Estados Unidos, México.

Valenzuela totonacus (Mockford 1966). Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá.

Valenzuela podacrophaeus (Enderlein 1909). Jalapa. EV.

Valenzuela veracruzensis (Mockford 1969). 5 km al S de Tecolutla. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz.

Valenzuela mexicanus (Enderlein 1909). Jalapa. EM. Chiapas, Hidalgo, Michoacán, N.L., Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz.

Valenzuela distinctus (Mockford 1966). 27 km al N de Alvarado. Estados Unidos, México, Surinam, Trinidad, Galápagos.

Valenzuela sp. M (posticus group). Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.

Valenzuela sp. O-2 (posticus group). Los Tuxtlas. EV.

Valenzuela sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Valenzuela sp. 2. Los Tuxtlas. EV.

Valenzuela sp. 3. Los Tuxtlas. EV.

Valenzuela sp. 4. Los Tuxtlas. EV.

Valenzuela sp. 5. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Veracruz.

Valenzuela sp. 6. Los Tuxtlas. EV.

Xanthocaecilius brevicornis Mockford 1989. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Hidalgo, Veracruz.

Xanthocaecilius granulosus Mockford 1989. Los Tuxtlas. México, Panamá, Venezuela, Brasil.

Dasydemellidae

Dasydemella silvestrii Enderlein 1909. Jalapa. 31 km al O de Orizaba. Ca. Naolinco. Las Minas, 30 km al N de Perote. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, D. F., Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, N.L., Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.

Dasydemella sp. 2. Los Tuxtlas. México, América del Sur.

Stenopsocidae

Graphopsocus mexicanus Enderlein 1909. Jalapa. Los Tuxtlas. México, Venezuela, Brasil (?).

Archipsocidae

Archipsocopsis frater Mockford (1957). Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Jamaica, Brasil.

Archipsocus group 1. Los Tuxtlas. EV.

Archipsocus group 2A. Los Tuxtlas. EV.

Archipsocus group 2B, sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Archipsocus group 2B, sp. 2. Los Tuxtlas. EV.

Pararchipsocus poblanus Badonnel, Mockford & García Aldrete 1984. 15.3 km al E de Orizaba. EM. Chiapas, Hidalgo, Puebla, Veracruz.

Pseudarchipsocus veracruzanus Badonnel, Mockford & García Aldrete 1984. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Ectopsocidae

Ectopsocus briggsi McLachlan 1899. 7 km al SE de Altotonga. 19 km al SO de Perote. 8 km al NE de Orizaba. Ca. Naolinco. Ca. Maltrata. Cosmopolita.

Ectopsocus chiapensis García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.

Ectopsocus eertmoedi García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EM. Tabasco, Veracruz.

Ectopsocus formosus García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Isla María Madre, San Luis Potosí, Veracruz.

Ectopsocus maindroni Badonnel 1935. 28 km al SE de Paso del Toro. Los Tuxtlas. De amplia distribución en climas cálidos.

Ectopsocus meridionalis Ribaga 1904. 2 km al SO de Fortín. Barranca de Metlac. Ca. Naolinco. Ca. Perote. Los Tuxtlas. De amplia distribución, a veces doméstica.

Ectopsocus obscurus García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Oaxaca, Isla San Juanito, Veracruz.

Ectopsocus thibaudi Badonnel 1979. 28 km al SO de Paso del Toro. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Antillas, Guayanas.

Ectopsocus thorntoni García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EM. Tabasco, Veracruz.

Ectopsocus titschacki Jentsch 1939. Los Tuxtlas. Tropicopolita.

Ectopsocus tuxtlarum García Aldrete 1991. Los Tuxtlas. EV.

Ectopsocus vachoni Badonnel 1945. Ca. Perote. 10 km al E de Acayucan. Los Tuxtlas. De amplia distribución en países de clima cálido.

Ectopsocus vilhenai Badonnel 1955. 28 km al SE de Paso del Toro. Chavarillo, Emiliano Zapata, ca. Jalapa. La Nueva Esperanza, Alamo. Tropicopolita.

Ectopsocus veracruzensis García Aldrete 1991. Río Nautla, ca. desembocadura. Los Tuxtlas. EV.

Peripsocidae

Peripsocus madescens Walsh (1863). Los Tuxtlas. Canadá, Estados Unidos, México.

Peripsocus pauliani Badonnel 1949. Los Tuxtlas. Estados Unidos, Islas Bermudas, Santa Helena, Antillas, México, Panamá, Brasil, Guayanas, Venezuela, Angola, Costa de Marfil, Hong Kong, Japón, Malasia, Filipinas, Sri Lanka, Galápagos, Melanesia, Polinesia.

Peripsocus potosi Mockford 1971. Los Tuxtlas. De amplia distribución en América tropical y subtropical.

Peripsocus ca. australis Mockford. Los Tuxtlas. EM. Tabasco, Veracruz.

Peripsocus ca. madidus (Hagen). Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,

N. L., Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz.

Peripsocus ca. *stagnivagus* Chapman. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Chiapas, Islas Clarión y María Madre, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz.

Peripsocus sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Peripsocus sp. 2. Los Tuxtlas. EV.

Peripsocus ca. *subfasciatus* (Rambur), sp.1. Los Tuxtlas. EV.

Kaestneriella obscura Mockford & Wong 1969. 6.4 km al O de Jalacingo. EM. Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Veracruz.

Kaestneriella setosa Mockford & Wong 1969. Los Tuxtlas. México, Guatemala, El Salvador.

Lachesillidae

Anomopsocus sp. a. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Lachesilla aethiopica (Enderlein 1902). 6 km al SO de Fortín de las Flores. Zona Arqueológica de Tajín, ca. Papantla. 8 km al NE de Orizaba. Los Tuxtlas. De amplia distribución.

Lachesilla acuminiforceps García Aldrete 1996. 11 km al E de Papantla. 7 km al N de Nautla. Los Tuxtlas. México, Puerto Rico, República Dominicana.

Lachesilla anahuacensis Mockford 2002. Los Tuxtlas. México, Nicaragua.

Lachesilla aspera García Aldrete 1990. Los Tuxtlas. EM. D. F., Durango, Morelos, N. L., Puebla, Veracruz.

Lachesilla bifurcata García Aldrete 1986. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Chiapas, Hidalgo, N. L., Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla bottimeri Mockford & Gurney 1956. Ca. Jalapa. México y SE de Estados Unidos.

Lachesilla carinata García Aldrete 1999. 8 km al S de Tecolutla. Ca. Tuxpan. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Isla María Madre, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla centralis García Aldrete 1983. Ca. Jalapa, Instituto de Ecología, A. C. Ca. Coatepec, hacia Huatusco. Estados Unidos, México.

Lachesilla cuala García Aldrete 1988. 11 km al E de Papantla. Ca. Coatepec, hacia Huatusco. Los Tuxtlas. De amplia distribución en América tropical y subtropical.

Lachesilla curviforceps García Aldrete 1974. 6 km al O de Jalacingo. EM. Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla dasylyrionicola García Aldrete 1990. 19 km al SO de Perote. EM. Puebla, Veracruz.

Lachesilla delta García Aldrete 1985. Cofre de Perote. EM. D. F., México, Michoacán, Morelos, N. L., Puebla, Veracruz.

Lachesilla denticulata García Aldrete 1988. 23 km al N de Nautla. 6 km al O de Tlapacoyan. Río Otapa. Ca. Tecolutla. Los Tuxtlas. México, Centro América, Caribe.

Lachesilla dispariforceps Mockford 1986. 5 km al SO de Fortín de las Flores. 31 km al SO de Orizaba. EM. Chiapas, D. F., Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla estradaorum García Aldrete 1999. Los Tuxtlas. EV.

Lachesilla fuscipalpis Badonnel 1972. 19 km al SO de Perote. Estados Unidos, México, Perú, Chile.

Lachesilla gamma García Aldrete 1985. 14 km al NO de Jalapa. 6 km al O de Jalacingo. Las Minas, 30 km al N de Perote. 31 km al SO de Orizaba. EM. Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz.

Lachesilla hermosa García Aldrete 1982. 31 km al SO de Orizaba. EM. Hidalgo, Jalisco, N. L., Oaxaca, Veracruz.

Lachesilla huasteca Mockford 2002. 8 km al S de Tecolutla. 10 km al N de Lerdo. Estados Unidos, México,

Puerto Rico.

Lachesilla juniperana García Aldrete 1990. Los Tuxtlas. 17 km al NE de San Luis Atexcac. 19 km al SO de Perote. EM. Durango, México, N. L., Veracruz.

Lachesilla kathrynae Mockford & Gurney 1956. 28 km al SE de Paso del Toro. Estados Unidos, México.

Lachesilla laciniosiforceps García Aldrete 1999. 15 km al E de Orizaba. 1.6 km al SO de Fortín de las Flores. Ca. Maltrata. Las Minas, 30 km al N de Perote. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Guatemala.

Lachesilla leonilae García Aldrete 1986. 27 km al N de Nautla. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. EM. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla maculata García Aldrete 1999. Los Tuxtlas. 32 km al E de Coatzacoalcos. México, Belice.

Lachesilla nuptialis Badonnel & García Aldrete 1980. Los Tuxtlas.

México, Guatemala, Belice.

Lachesilla penta Sommerman 1946. 2 km al SO de Fortín de las Flores. Los Tuxtlas. México y SE de Estados Unidos.

Lachesilla perezi García Aldrete 1983. 6 km al O de Tlapacoyan. 1 km al SO de Fortín de las Flores. 4 km al O de Yanga. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México.

Lachesilla punctata (Banks 1905). 17 km al NE de San Luis Atexcac. Cofre de Perote. Estados Unidos, México.

Lachesilla rectiforceps García Aldrete 1999. 23 km al NO de Alvarado. Los Tuxtlas. México, Guayana Francesa.

Lachesilla sandersoni Mockford 1974. 8 km al S de Tecolutla. 27 km al N de Nautla. México, Cuba, R. Dominicana, Jamaica, Guatemala, Guayana Francesa.

Lachesilla silvatica García Aldrete 1988. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Jalisco, Isla María Madre, Veracruz.

Lachesilla sulcata García Aldrete 1986. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México.

Lachesilla tectorum Badonnel 1931. Los Tuxtlas. De amplia distribución.

Lachesilla tropica García Aldrete 1982. 56 km al N de Zempoala. Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Jamaica.

Lachesilla wongae García Aldrete 1990. Los Tuxtlas. EV.

Lachesilla xalapensis García Aldrete 2001. Ca. Jalapa. EV.

Lachesilla yanomamioides García Aldrete 1996. Los Tuxtlas. México, Guatemala, Trinidad.

Lachesilla C-5. Los Tuxtlas. México, Guatemala.

Lachesilla C-21. 10 km al E de Orizaba. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla C-28. 15 km al E de Orizaba. 21 km al N de Casitas. EM. Hidalgo, Veracruz.

Lachesilla ca. C-32. 31 km al O de Orizaba. EV.

Lachesilla F-17. Los Tuxtlas. México, Guatemala, Panamá.

Lachesilla P-12. Los Tuxtlas. EM. Tamaulipas, Veracruz.

Lachesilla P-14. Los Tuxtlas. EM. Hidalgo, Veracruz.

Lachesilla Q-7. 7 km al SE de Altotonga. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. Las Minas, 30 km al N de Perote. 31 km al SO de Orizaba. Ca. Perote. EM. Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, N. L., Puebla, Veracruz.

Nanolachesilla hirundoides Mockford & Sullivan 1986. 22.4 km al S de Pánuco. EM. San Luis Potosí, Veracruz.

Nanolachesilla nanciae (Turner 1975). 19.2 km al S de Alvarado. 9.6 km al N de Lerdo. México, Jamaica.

Prolachesilla mexicana Mockford & Sullivan 1986. Los Tuxtlas. México, Guatemala, Panamá.

Prolachesilla pallida Mockford & Sullivan 1986. Los Tuxtlas. México, Panamá.

Elipsocidae

Nepiomorpha brasiliana Badonnel 1973. Los Tuxtlas. De amplia distribución en América tropical y subtropical.

Philotarsidae

Garcialdretia veracruzensis Mockford (nombre en manuscrito). Los Tuxtlas. EV.

Haplophallus sp. 1. Ca Tuxpan. Los Tuxtlas. EM. Colima, Guerrero, Jalisco, Isla María Madre, Sinaloa, Tabasco, Veracruz.

Philotarsus incurvatus Mockford (nombre en manuscrito). Los Tuxtlas. EM. Hidalgo, Veracruz.

Philotarsus sp. 1. 13 km al E de Las Vigas. EM. Nuevo León, Veracruz.

Aaroniella sp. 1. Coatzacoalcos. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Veracruz, Yucatán.

Aaroniella sp. 3. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Veracruz, Yucatán.

Pseudocaeciliidae

Heterocaecilius badonneli García Aldrete 1989. Los Tuxtlas. EM. Campeche, Q. Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

Pseudocaecilius citricola (Ashmead 1879). Los Tuxtlas. Tropicopolita.

Pseudocaecilius tahitiensis (Karny 1926). 8 km al S de Espinal. Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Venezuela, Togo, Galápagos, Micronesia, Polinesia.

Scytosopus coriaceus Roesler 1940. Ca. Tuxpan. La Nueva Esperanza, Alamo. Los Tuxtlas. México, Cuba, Jamaica, Brasil.

Hemipsocidae

Hemipsocus africanus Enderlein 1907. 2 km al E de Acayucan. 3 km al SE de Cuitláhuac. 4 km al O de Yanga. Río Otapa. Ca. Tecolutla. 23 km al NO de Alvarado. Actopan, Estación de Biología La Mancha. La Nueva Esperanza, Alamo. Los Tuxtlas. Tropicopolita.

Hemipsocus chloroticus (Hagen 1858). Los Tuxtlas. De amplia distribución.

Psocidae

Amphigerontia montivaga (Chapman 1930). Los Tuxtlas. Estados Unidos, México, Guatemala.

Amphigerontia petiolata (Banks 1918). Los Tuxtlas. Canadá, Estados Unidos, México.

Amphigerontia sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Amphigerontia sp. 2. Los Tuxtlas. EM. Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, N. L., Puebla, Veracruz.

Amphigerontia sp. 3. 27 km al NO de Jalapa. Ca. Perote. EM. Chiapas, D. F., México, Michoacán, Puebla, Veracruz.

Blaste garciorum Mockford 1984. 36.8 km al O de Nautla. 9.3 km al E de Las Vigas. Estados Unidos, México, Honduras.

Blaste posticata (Banks 1905). 27.2 km al N de Alvarado. 9.6 km al N de Lerdo. 8 km al S de Tecolutla. Los Tuxtlas. México, Belice, Guatemala, Honduras.

Blaste sp. 1. 22 km al NO de Jalapa. Los Tuxtlas. EV.

Blaste sp. 2. 20 km al O de Jalapa. Los Tuxtlas. EV.

Blaste sp. 3'. Los Tuxtlas. EV.

Blaste sp. 4. Los Tuxtlas. EV.

Blaste sp. 5. Los Tuxtlas. EV.

Blastosocus ca. *lithinus* (Chapman). Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Jalisco, Isla María Madre, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz.

Blastosocus ca. *semistriatus* (Walsh), sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

- Blastopsocus* sp. 2. Los Tuxtlas. EV.
- Blastopsocus* sp. 3. Los Tuxtlas. EV.
- Blastopsocus* sp. 5. Los Tuxtlas. EV.
- Cerastipsocus reductus* (Banks 1920). Jalapa. Fortín de las Flores. México, Costa Rica.
- Cerastipsocus trifasciatus* (Provancher 1876). Los Tuxtlas. De amplia distribución en América tropical y subtropical.
- Cerastipsocus venosus* (Burmeister 1839). Los Tuxtlas. Canadá, Estados Unidos, México, Cuba.
- Hyalopsocus* sp. 4. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. EM. México, Veracruz.
- Indiopsocus bisignatus* (Banks 1904). La Esperanza, Alamo. Estados Unidos, México, Honduras.
- Indiopsocus* sp. 1. Los Tuxtlas. EV.
- Indiopsocus* sp. 2. Los Tuxtlas. Naolinco. Ca. Tuxpan. Puerto de Veracruz. 20 km al NO de Alvarado. La Esperanza, Alamo. EV.
- Indiopsocus* sp. 3. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Oaxaca, Veracruz.
- Indiopsocus* sp. 4. Los Tuxtlas. EV.
- Indiopsocus* sp. 5. Los Tuxtlas. EV.
- Indiopsocus* sp. 6. Los Tuxtlas. EV.
- Indiopsocus* sp. 7. Los Tuxtlas. EV.
- Indiopsocus* sp. 8. Los Tuxtlas. EV.
- Metylophorus barretti* (Banks 1900). 27 km al NO de Jalapa. Ca. Altotonga. Estados Unidos, México.
- Metylophorus novaescotiae* (Walker). Los Tuxtlas. Canadá, Estados Unidos, México.
- Metylophorus* sp. 1. Los Tuxtlas. Coatzacoalcos. EM. Chiapas, Puebla, S. L. P., Tabasco, Veracruz.
- Metylophorus* sp. 2. Los Tuxtlas. EM. México, Puebla, Veracruz.
- Metylophorus* sp. 5. Los Tuxtlas. EV.
- Metylophorus* sp. 12. Los Tuxtlas. EM. Hidalgo, N. L., Tamaulipas, Veracruz.
- Psococerastis fasciata* Mockford 1981. Barranca de Metlac, ca. Fortín de las Flores. Los Tuxtlas. México, Belice, Panamá, Brasil.
- Psocidus* sp. 1. Los Tuxtlas. EM. Oaxaca, Tabasco, Veracruz.
- Psocidus* sp. 2. Los Tuxtlas. EV.
- Ptycta* ca. *lineata* Mockford. Los Tuxtlas. EV.
- Ptycta* ca. *polluta* (Walsh), sp. 2. Los Tuxtlas. EV.
- Ptycta tikala* (Mockford 1957). 23 km al NO de Alvarado. Los Tuxtlas. México, Guatemala, Panamá.
- Ptycta* sp. 1. Los Tuxtlas. EV.
- Ptycta* sp. 2. Los Tuxtlas. EV.
- Ptycta* sp. 20 km al O de Jalapa. 13 km al E de Las Vigas. Ca. Jalapa. Los Tuxtlas. EV.
- Steleops* sp. 1. Los Tuxtlas. EV.
- Steleops* sp. 2. Los Tuxtlas. EV.
- Steleops* sp. 3. Los Tuxtlas. EV.
- Thyrsopsocus psocoides* Enderlein 1900. Los Tuxtlas. México, Perú.
- Trichadenotecnum chiapense* Yoshizawa, García Aldrete & Mockford (nombre en manuscrito). Los Tuxtlas. México, Belice.
- Trichadenotecnum concinum* Yoshizawa, García Aldrete & Mockford (nombre en manuscrito). Los Tuxtlas. EV.

Trichadenotecnum ericium Yoshizawa, García Aldrete & Mockford (nombre en manuscrito). 6.4 km al O de Jalacingo. EM. Puebla, Veracruz.

Trichadenotecnum guttatum Yoshizawa, García Aldrete & Mockford (nombre en manuscrito). 15 km al E de Orizaba. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Veracruz.

Trichadenotecnum magnolingum Yoshizawa, García Aldrete & Mockford (nombre en manuscrito). Ca. Perote. EM. México, Michoacán, Veracruz.

Trichadenotecnum pardus Badonnel 1955. 23.5 km al N de Nautla. 23 km al N de Alvarado. Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico, R. Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, Trinidad, Surinam, Angola, Madagascar, Nigeria, Togo, Reunión, China, Hong Kong, Nueva Bretaña, Nueva Guinea, Singapur.

Trichadenotecnum sp. 1. La Nueva Esperanza, Alamo. Los Tuxtlas. EV.

Trichadenotecnum sp. 2. Los Tuxtlas. EV.

Trichadenotecnum sp. 3. Los Tuxtlas. EV.

Trichadenotecnum sp. 4. Los Tuxtlas. EV.

Myopsocidae

Lichenomima sparsa (Hagen 1861). Los Tuxtlas. Canadá, Estados Unidos, México, Cuba.

Lichenomima varia (Navás 1927). Los Tuxtlas. México, Costa Rica.

Lichenomima sp. 1. Los Tuxtlas. EV.

Lichenomima sp. 2. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Veracruz.

Lichenomima sp. 4. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Hidalgo, Veracruz.

Lichenomima sp. 7. Los Tuxtlas. EM. Jalisco, Veracruz.

Lichenomima sp. 11. 2 km al E de Acayucan. EM. Veracruz, Yucatán.

Lichenomima sp. 12. Las Minas, 30 km al N de Perote. EV.

Lichenomima sp. 13. Los Tuxtlas. EM. Chiapas, Veracruz.

Lichenomima sp. 14 (ca. varia Navás). Los Tuxtlas. EM. Guerrero, Islas María Madre y San Juanito, Jalisco, Oaxaca, Veracruz.

Lichenomima sp. 15. Los Tuxtlas. EV.

Myopsocus minutus (Mockford 1974). 23 km al NO de Alvarado. Los Tuxtlas. México, Cuba, R. Dominicana.

*** La región de Los Tuxtlas se encuentra entre 16°06'-18°40'N y 94°35'-95°30'O, tiene 98 km de largo por 33 km de ancho, y una superficie de 3,234 km². Comprende los municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Ángel R. Cabada, San Pedro Sotepan, Tatahuicapan de Juárez, Mecayapan, Pajapan y Hueyapan de Ocampo. La recolecta de psocópteros se llevó a cabo principalmente en los tres primeros municipios, y en la Estación de Biología de la UNAM, ca. Balzapote. Para datos más puntuales sobre las localidades de colecta y habitat, dirigirse al autor (<anga@ibiologia.unam.mx>).